


《湖州防疫实战手册(公众版)》

(检测篇)

新冠肺炎疫情大流行的背景下,开展核酸检测是快速发现病毒感染者、有效切断传播途径、落实“四早”措施、快速处置疫情的重要手段。对于普通居民来说,积极配合防控需要、主动进行核酸检测,是应尽的责任。发生疫情后,该到哪里做核酸检测?需要注意什么?这里为大家梳理了16个常见的问题。

1. 哪些机构可以提供日常的核酸检测服务?

为方便市民就近开展核酸检测,目前,全市共有80家医疗卫生机构提供新冠肺炎病毒核酸采样服务,包括5家市级医院,各区县二级及以上医疗机构、乡镇卫生院和社区卫生服务中心。市民可关注湖州发布、南太湖号和健康湖州发布及相关区县官方微信公众号,搜索全市核酸采样点信息。



2. 核酸采样时应该注意什么?

(1)采样前注意

接种新冠病毒疫苗后,需间隔48小时方可进行核酸检测。
为避免出现呕吐情况,采样前2小时请勿进食;为避免影响检测结果,采样前半小时内尽量不要喝水、进食。

出门前,带好身份证或采样二维码,洗手并正确佩戴好口罩,最好再备一个口罩。全程正确佩戴口罩,排队时保持1米距离,避免聚集和相互交谈。

(2)采样时注意

始终保持安全距离,在医务人员完成前一名受检者采样并双手消毒拿出新棉签后,再迅速上前脱下口罩张嘴采样,采样后立即

戴好口罩。

不要用手直接接触操作台上的物品,不要把钥匙、手机、身份证等私人物品放在台面上。

在采样时,应头后仰,尽量放松,轻张口、不喊叫、不做深呼吸。如因不适想要咳嗽或者呕吐时,应用纸巾或手肘遮挡。

(3)采样后注意

采样完成后,应进行手部消毒。擦拭后的纸巾或废弃口罩不乱丢弃,应放置于医疗废弃物垃圾袋中。

戴好口罩,有序离开,不在采样点逗留。检测结果通常在24小时内可查询。如未能查询到检测结果,请耐心等待。

3. 核酸采样方法有哪些?

在检测过程中,医务人员通过收集测试对象的咽拭子,筛选新型冠状病毒。但实际上咽拭子是总称,包括鼻咽拭子和口咽拭子,迄今为止使用较多的是口咽拭子。

鼻咽拭子和口咽拭子的最大区别实际

上是取样路径。鼻咽拭子需要通过患者的鼻孔收集,采样人员站在侧位,暴露风险低,可以获得更充分的标本,提高检查准确性。采集口咽拭子时,患者必须张开嘴,医务人员用长棉签深入双侧咽扁桃体和咽后壁,擦拭并吸附分泌物。

4. 采咽拭子疼吗?

咽拭子是指通过一根棉签在咽喉处采集样本的方法,不会疼,有的人会感觉轻微恶心或轻度的咽部不适,采集后会很快缓解或消失。



5. 核酸检测会不会影响健康?

对身体没有影响,只是取少量的咽和扁桃体分泌物标本。

6. 如何查询自己的核酸检测结果?

可以通过“浙里办”或“支付宝”APP中的健康码查询核酸检测结果。如检测结果为阳性,相关部门将会第一时间联系


你,并根据防控和诊疗要求进行规范处置(所以核酸检测后没有接到电话就是最好的消息,说明很安全)。

7. 纸质版的核酸检测报告如何获取?

可以携带核酸检测条码至检测机构自助打印机、检验科窗口或门诊服务台打印。

8. 哪些机构可以出具英文版的核酸检测报告?

湖州市中心医院、湖州市第一人民医院、吴兴区人民医院、德清县人民医院、安吉县人民医院、安吉县第三人民医院、安吉县妇幼保健院可以提供英文版的核酸检测报告。



9. 发生疫情后,为什么要开展区域全员核酸检测?

开展区域全员核酸检测,能够精准及时地发现新冠病毒感染者,降低传播风险,实现

“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,对于防止疫情扩散和外溢将起到十分重要的作用。

10. 发生疫情后,区域全员核酸检测分别去哪里采样?

封控区内人员由医务人员上门采样;管控区和防范区人员按照村(社区)通知,在规定时间内到小区临时采样点集中采样。

11. 区域核酸检测采样需要提供一个二维码,这个二维码如何生成?如何保存?

为了减少采样人员信息采集时间,居民可以用手机扫描“浙江省核酸采集应急平台指定二维码”,提前填写个人信息后生成个人二维码,截图保存即可,保存时长为30天,可反复生成。

如果事先未生成个人二维码的居民,也可携带智能手机或身份证原件(无身份证的儿童携带户口本),前往采样点现场生成二维码,或通过扫描身份证完成登记,或由工作人员手工登记。

12. 区域核酸采样结束后需要注意什么?

按照引导迅速从出口离场,擦拭后的纸巾或废弃口罩不乱丢弃,应放置于医疗废弃物垃圾袋中。返回家中,遵守当前防控规定。

13. 区域核酸采样时,行动不便的人员怎么办?

管控区和防范区内行动不便的特殊人群,如长期卧床的慢性病患者、行动不便的残疾人等,可联系村(社区)防控办,由村(社区)安排人员上门采样。

14. 小孩也要做核酸检测吗?怎么做?

儿童同样可能感染新冠病毒,因此也应进行核酸检测。如果宝宝年龄过小,无法自主配合医务人员进行采样,家长可稍用力捏住宝宝两边的脸颊,待宝宝张嘴后进行咽拭子采集。切勿强行掰嘴,避免对宝宝的口腔造成伤害,同时加重孩子恐惧心理,影响样本采集。



15. 区域核酸采样时,错过采样时间怎么办?

如果错过采样时间,可与村(社区)联系,预约时间进行补采。

16. 混样检测会不会影响检测结果?

不会影响检测结果。样本混检虽然把多份样本混样,但病毒依然存在,并均匀分布在样本保存液中,仅仅是病毒浓度被稀释了。在通常情况下,一毫升样本里有

500个病毒就可以被检测出来。而新冠病毒携带者的样本中,每毫升通常有上百万个病毒。因此即便被稀释了,检测结果也很靠谱。

