


《湖州防疫实战手册(公众版)》

(接种篇)

接种疫苗是预防新冠肺炎最经济有效的办法。从国内外研究结果来看,完成新冠疫苗全程接种,在预防重症、降低死亡率等方面效果显著。接种疫苗一段时间后,疫苗对部分人员的保护效果可能会减弱,适时进行加强免疫接种可以使已经逐步减少的中和抗体快速增长或反弹,从而产生更好的保护效果。



1、新冠疫苗全民免费接种的对象有哪些?

现阶段为3周岁及以上人群。



6、腺病毒载体新冠疫苗接种几针? 什么人群可以打?

18周岁及以上人群接种1剂次。接种1剂次满6个月后可接种加强针。



11、如果第二针超过规定时间没有接种,应该怎么办?

可以主动联系所属接种单位进行接种。如无法在规定时间内接种的,依然可以继续接种,尽早补种完成,无需重新接种。



16、哪些人群不建议接种新冠疫苗加强针?

- ①对新冠疫苗的活性成分、任何一种非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者,或以前接种同类疫苗时出现过敏者;
- ②既往发生过疫苗严重过敏反应者(如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等);
- ③患有未控制的癫痫和其他严重神经系统疾病者(如横贯性脊髓炎、格林巴利综合征、脱髓鞘疾病等);
- ④正在发热者,或患急性疾病,或慢性疾病的急性发作期,或未控制的严重慢性病患者;
- ⑤妊娠期妇女。



2、去哪里接种新冠疫苗?

按照属地管理、就近方便的原则,建议往居住地所在乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心接种门诊接种疫苗,可提前电话咨询接种门诊或疾控中心相关事项。



7、不同新冠疫苗产品之间可以替换接种吗?

现阶段建议用同一个疫苗产品完成接种。如遇疫苗无法继续供应、受种者异地接种等特殊情况,无法用同一个疫苗产品完成接种时,可采用相同种类的其他生产企业的疫苗产品完成接种。



12、接种新冠疫苗的注意事项有哪些?

接种前应提前了解新冠疫苗相关知识和接种流程;在接种时需携带身份证件、接种凭证等,并根据防控要求,做好个人防护,配合现场接种工作人员询问。既往所患疾病以及近期是否用药都应告知医师;接种后,按规定留观30分钟,保持接种部位皮肤的清洁,避免用手搔抓接种部位。




3、新冠疫苗接种途径和接种部位是什么?

上臂三角肌肌肉内注射。



8、其他疫苗可以和新冠病毒疫苗同时接种吗?

目前不建议新冠病毒疫苗与其他疫苗同时接种。建议新冠病毒疫苗和其他疫苗间隔两周以上接种。必须注意的是,当因动物致伤、外伤等原因需紧急接种狂犬病疫苗、破伤风疫苗、免疫球蛋白时,不受14天接种间隔的限制。



17、应对变异毒株,加强针是否更有效?

免疫系统准备需要时间,第一针是致敏,第二针和第三针是唤醒大量的记忆细胞,第三针诱导抗体的丰度和成熟度都远高于第二针。在这种情况下,它针对变异株的综合能力也会大大提高,第三针比第二针差不多会提高5至10倍以上的能力应对变异株。



4、新冠病毒灭活疫苗需要接种几针?

接种2剂次,北京科兴中维新冠疫苗2剂间隔≥14天;国药集团新冠疫苗2剂间隔≥21天。完成2剂次新冠病毒灭活疫苗接种满6个月可接种加强针。



9、3-17岁人群接种的新冠病毒疫苗种类是什么?

3-17岁人群接种的为新冠病毒灭活疫苗,接种方式和剂次与成人是一样的,也是两针,中间间隔至少14天或21天,具体以疫苗说明书为准。



13、接种新冠疫苗后可能出现哪些不良反应?

接种后一般不良反应包括注射部位疼痛、肿、局部瘙痒等局部反应及发热、乏力等全身反应。无论是局部反应还是全身反应,大多是一过性可自愈的,严重不良反应极其罕见。



18、老年人需要接种新冠疫苗吗?

60岁及以上老年人群是感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群,接种疫苗后可有效降低感染率、重症率、病死率。符合接种条件的老年人更应尽快接种疫苗。



5、重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)接种几针,间隔多久?

重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)全程需接种3剂;相邻2剂之间接种的间隔时间建议≥4周,第2剂尽量在接种第1剂次后8周内完成,第3剂尽量在接种第1剂次后6个月内完成。

10、对于变异毒株,国产新冠病毒疫苗是否有效?

接种疫苗仍是抵御新冠病毒的有效手段。虽然疫苗对新冠变异株的保护力下降,但变异株仍在疫苗保护范围内,特别是中和抗体保护率。数据显示我国疫苗可有效降低住院率、重症率和死亡率。

14、为什么要开展新冠疫苗加强针接种?

从国内外研究结果来看,完成新冠疫苗全程接种,在预防重症、降低死亡率等方面效果显著。但接种疫苗一段时间后,疫苗对部分人员的保护效果可能会减弱,适时进行加强免疫接种可以使已经逐步减少的中和抗体快速增长或反弹,从而产生更好的保护效果。

15、哪些人群可以打新冠疫苗加强针?

加强免疫的对象为完成2剂次新冠病毒灭活疫苗或1剂次腺病毒载体新冠疫苗接种后满6个月的18岁及以上人群。



19、接种疫苗后,还需要戴口罩吗?

目前为止还没有任何一个疫苗说保护率达到百分之百的。在当前群体免疫还没有建立起来的情况下,我们建议即使打了疫苗,仍要继续维持个人防护措施,包括戴口罩、保持社交距离、勤洗手等这些好习惯,以更好地保障大家的安全。

20、刚接种新冠疫苗可以做核酸检测吗?

在接种场所工作人员开启疫苗瓶、抽取疫苗液等过程中,注射器或疫苗瓶内的液体残留等可能会以液体或以气溶胶方式,污染接种场所的接种台、墙壁、门把手、接种人员和受种者衣物等物体表面,接种人员和相关环境很可能核酸检测结果呈阳性。因此接种新冠病毒疫苗后至少需间隔48小时才能做核酸检测。

